

Ayudantía 3.5 - MAT023

Fabián Ramírez / FabiMath

Problema 1

Calcule los siguientes límites

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{(x-2)^2(y-3)^3}{(x-2)^8 + (y-3)^4}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2(y)}{2x^2 + y^2}$$

$$c) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2yz}{x^4 + y^2z^2 + z^4}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 + y^2}$$

Problema 2

Sea:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } |y| < x^2 \\ 1 & \text{si } |y| \geq x^2 \end{cases}$$

Determine el dominio de continuidad de f

Problema 3

Sea:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(\sqrt{xy})}{y} & \text{si } y \neq 0 \wedge xy \geq 0 \\ \frac{x}{2} & \text{si } y = 0 \wedge x \geq 0 \end{cases}$$

Obtenga el dominio de continuidad de f .

Solución Problema 1:

a) Sean $u = x - 2, v = y - 2$ entonces:

$$\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^2 v^3}{u^8 + v^4}$$

Aproximándonos a $(0, 0)$ por la familia dada por $v = mu^2$



$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{u^2 (mu^2)^3}{u^8 + (mu^2)^4} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{m^3 u^8}{u^8 + m^4 u^8} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{m^3 u^8}{(1 + m^4) u^8} = \frac{m^3}{1 + m^4}$$

depende de m y por unicidad del límite, se tiene que el límite no existe.

b) Aproximándonos a $(0, 0)$ por la familia dada por $y = mx$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2(mx)}{2x^2 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2(mx)}{(2 + m^2)x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + m^2 \cdot \frac{\sin(mx)}{mx} \cdot \frac{\sin(mx)}{mx}}{2 + m^2} = \frac{1 + m^2}{2 + m^2}$$

depende de m y por unicidad del límite, se tiene que el límite no existe.

c) Aproximándonos a $(0, 0, 0)$ por la familia dada por $\varphi(t) = (t, mt, t)$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \cdot mt \cdot t}{t^4 + (mt)^2 t^2 + t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{mt^4}{(2 + m^2)t^4} = \frac{m}{2 + m^2}$$

depende de m y por unicidad del límite, se tiene que el límite no existe

d) Usando coordenadas polares el limite se convierte en:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2(\theta) + r \cos(\theta) \cdot r \sin(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 + r^2 \cos(\theta) \sin(\theta)}{r^2} = 1 + \cos(\theta) \sin(\theta)$$

como depende de θ y por unicidad del límite, se concluye que no existe el límite.

Solución Problema 2:

Pauta exclusiva de ayudantía, pero basta darse cuenta que es continua excepto en (a, a^2)

Solución Problema 3:

Notar que:

$$0 \leq \left| \frac{\sin((x-1)^3)}{(x-1)^2 + (y-2)^2} \right| = \frac{|\sin((x-1)^3)|}{(x-1)^2 + (y-2)^2} \leq \frac{|x-1|^3}{(x-1)^2 + (y-2)^2} \leq |x-1|$$

Luego:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} 0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} |x-1| = 0$$

Por teorema del acotamiento:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \left| \frac{\sin((x-1)^3)}{(x-1)^2 + (y-2)^2} \right| &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y) &= 0 \\ \Rightarrow f &\text{ es continua en } (1, 2) \end{aligned}$$